



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX RHÔNE-ALPES

Grandes Cultures

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

38 78.63.25.65

Bulletin n° 13 - 4 Août 1989

SOJA

Acariens jaunes : intervenir le plus souvent Sitones: apparitions sur certaines cultures

ACARIENS JAUNES

Situation

Certaines cultures de soja souffrant de la sècheresse, (cultures en sec, sol séchant, etc...) sont envahies par les acariens jaunes qui arrivent à décolorer les feuilles et même à les dessécher. C'est le cas plus particulièrement de la plaine de l'Ain, mais on retrouve ailleurs ce phénomène.

Préconisations

La sècheresse actuelle multipliant rapidement les populations, il est urgent de traiter lorsqu'il est encore temps, c'est-à-dire si la végétation n'est pas trop avancée, ou si la totalité des feuilles n'est pas déjà entièrement desséchée. L'idéal est d'intervenir en début d'attaque. Employer un produit à base de DICOFOL à 480 g/ha.

SITONES

Situation

Des invasions de ce coléoptère, habituellement inféodé au Pois, sont signalées dans certaines parcelles de soja, surtout dans l'Ain.

Préconisations

Ces adultes issus des larves printanières ne sont pas nocifs actuellement et ne nécessitent aucune intervention.



0